

**Capítulo 4 - DOI:10.55232/1085001.4**

**DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE  
ENDOMETRIOSE EM ADOLESCENTES**

**Antonio de Pádua Gonçalves Costa, Pedro Ivo de Sousa Neto, Gleydson Cavalcante Nogueira, Érika Krogh**

**Introdução:** Estima-se que a endometriose afete 10% a 15% de todas as mulheres em idade reprodutiva e, embora a maioria relate o início dos sintomas durante a adolescência, o diagnóstico geralmente é atrasado. Conseqüentemente, esse atraso pode diminuir o potencial reprodutivo e os resultados funcionais, mostrando a importância do diagnóstico precoce. **Objetivos:** Este trabalho tem como objetivo discutir a necessidade e a dificuldade do diagnóstico precoce da endometriose em adolescentes. **Métodos:** Revisão bibliográfica realizada a partir da pesquisa nas bases de dados: LILACS, PUBMED e SCIELO, referentes a estudos publicados nos últimos 5 anos, ante os descritores: “Endometriose na adolescência”, “Diagnóstico precoce” e “Dificuldade diagnóstica”. **Resultados:** Adolescentes com dor pélvica podem apresentar um desafio diagnóstico, porque descrevem dor acíclica e dor cíclica e podem apresentar uma série de sintomas confusos. A aparência intra-operatória da endometriose pode diferir da clássica de queimadura de pó normalmente observada em adultos, sendo, nas mulheres jovens, comum o achado de lesões claras, fibróticas e defeitos peritoneais. Outras análises já demonstram as principais localizações destas células: aderências pélvicas entre os ovários e o peritônio; e implantações superficiais no peritônio do saco de Douglas, no ligamento uterossacral e no septo retovaginal. Entretanto, o diagnóstico já deve ser fortemente considerado em adolescentes com dor pélvica refratária ao tratamento médico. **Conclusão:** Esta faixa etária é negligenciada porque pode apresentar sintomas atípicos. Estudos comprovam que a maioria das adolescentes apresentam endometriose em estágio inicial, confinada à pelve, sendo a doença progressiva. O diagnóstico precoce e a ablação ou remoção do tecido afetado podem diminuir os efeitos prejudiciais a longo prazo, incluindo dor crônica e infertilidade.

**Palavras-chave:** Endometriose, adolescentes, diagnóstico.

**Referências Bibliográficas:**

REZENDE, João Weliton Freitas et al. O uso de anticoncepcionais orais combinados na melhoria da qualidade de vida de adolescentes com endometriose. 2019.